


Geg: $F_1: \mathbb{R} \rightarrow [0,1], x \mapsto \frac{x-a}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) + \mathbb{1}_{(b,\infty)}(x), a,b \in \mathbb{R}, a < b$

$F_2: \mathbb{R} \rightarrow [0,1], x \mapsto \mathbb{1}_{[0,\infty)}(x) (1 - e^{-\lambda x}), \lambda > 0$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + (x-t)^2}$



a)

Beh: i) $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$
ist Dichte von F_1 .

ii) $f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)$
ist Dichte von F_2 .

Bew:

i) Sei $t \in \mathbb{R}$:
$$\int_{-\infty}^t f_1(x) dx = \begin{cases} 0, & t < a \\ \int_a^t \frac{1}{b-a} dx, & a \leq t \leq b \\ \int_a^b \frac{1}{b-a} dx, & t > b \end{cases} \quad (= [\frac{x}{b-a}]_a^b)$$

$$\int_{-\infty}^t f_1(x) dx = \int_{-\infty}^t \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) \mathbb{1}_{(-\infty,t]}(x) dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b] \cap (-\infty,t]}(x) dx$$

$$= \begin{cases} 0, & t < a \\ \frac{t-a}{b-a}, & a \leq t \leq b \\ \frac{b-a}{b-a} = 1, & b < t \end{cases} = F_1(t)$$

Zudem ist f_1 messbar, da $\frac{1}{b-a}$ eine Konstante ist und die Indikatorfunktion $\mathbb{1}_{[a,b]}$ messbar ist. Außerdem gilt $f_1 \geq 0$ und $\int_{\mathbb{R}} f_1(x) dx = 1$.

$\Rightarrow f_1$ ist Dichtefunktion von F_1 .

ii) Sei $t \in \mathbb{R}$:
$$\int_{-\infty}^t f_2(x) dx = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$= \mathbb{1}_{[0,\infty)}(t) \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$\int_{\mathbb{R}} f_2(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [-e^{-\lambda x}]_0^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - e^{-\lambda n}) = 1 - 0 = 1$$

$$-e^{-\lambda t} - (-e^{-\lambda \cdot 0}) = -e^{-\lambda t} + 1$$

$$= \mathbb{1}_{[0, \infty)}(t) [-e^{-\lambda x}]_0^t$$

$$= \mathbb{1}_{[0, \infty)}(t) (1 - e^{-\lambda t}) = F_2(t)$$

Zudem ist f_2 als Produkt einer (mit dem Indikator) stetigen Funktion und einer Indikatorfunktion einer messbaren Menge messbar. Mit $f_2 \geq 0$ und $\int_{\mathbb{R}} f_2 dx = 1$ folgt $\Rightarrow f_2$ ist Dichtefunktion von F_2 .

b) Beh: Für $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \mathbb{1}_{[0, \sqrt{3}]}(x) \frac{2}{3}x$ und $G(t) := \int_{-\infty}^t g(x) dx \quad \forall t \in \mathbb{R}$ gilt $\mathbb{P}_g((-\infty, 1)) = \frac{1}{3}$ und $\mathbb{P}_g([1, \infty)) = \frac{2}{3}$

Bew: g ist messbar (vgl. 1 a) f_2), $g \geq 0$ und

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2}{3}x dx = \left[\frac{1}{3}x^2 \right]_0^{\sqrt{3}} = 1$$

$\Rightarrow g$ ist Dichtefunktion

$$\text{Sei } t \in \mathbb{R}: G(t) = \int_{-\infty}^t g(x) dx = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \int_0^t \frac{2}{3}x dx, & 0 \leq t \leq \sqrt{3} \\ 1, & t > \sqrt{3} \end{cases} = \mathbb{1}_{[0, \sqrt{3}]}(t) \frac{1}{3}t^2 + \mathbb{1}_{(\sqrt{3}, \infty)}(t)$$

$[-\frac{1}{3}x^2]_0^t = -\frac{1}{3}t^2$ $(= \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2}{3}x dx = 1)$

G ist stetig (weil diff'bar), daher gilt (vgl. Gr.üb)

$$\mathbb{P}_g((-\infty, 1)) = \mathbb{P}_g((-\infty, 1]) = G(1) = \frac{1}{3} \quad \text{und}$$

$\mathbb{P}_g(\{1\}) = 0$

$$\mathbb{P}_g([1, \infty)) = 1 - \mathbb{P}_g((-\infty, 1)) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \quad \square$$

$\mathbb{P}_g(\text{W-Map})$

geg: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + (x-t)^2}$,
 $s, t \in \mathbb{R}, s > 0$

c) Beh: f ist Dichtefunktion

Bew: $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + (x-t)^2} dx$


Linearität $= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{s + \frac{1}{s}(x-t)^2} dx$

Substitution mit $y = \frac{x-t}{s}$ $= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-t}{s}\right)^2} \frac{1}{s} dx$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{s} \Rightarrow dy = \frac{1}{s} dx$ $= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1$

f ist messbar, da stetig und $f \geq 0$.

$\Rightarrow f$ ist Dichtefunktion



Interpretation von s und t:

f wird für Werte von x in der Nähe von t "groß", d.h. t gibt das Zentrum der Masse an. Für kleine Werte von s sind die Werte von f in der Nähe von t größer und für große s kleiner. s gibt also an wie gestreut die Masse auf \mathbb{R} verteilt ist.

d) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{c_p} x^{-p} \mathbb{1}_{[1, \infty)}(x)$

Beh: Für $c_p = \frac{1}{p-1}$ ist g eine Dichtefunktion, $p > 1$

Bew: Sei $p > 1$ beliebig. $g \geq 0$ und g (auf Indikator) stetig, also g messbar.

$c_p > 0$, da $p > 1$
 $x^{-p} > 0$ auf $\mathbb{1}_{[1, \infty)}(x)$


$$\begin{aligned}
 \text{Dazu gilt } \int_{\mathbb{R}} g(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{C_p} x^{-p} \mathbb{1}_{(1, \infty)}(x) dx \\
 &\stackrel{\text{Linearität}}{=} \frac{1}{C_p} \int_1^{\infty} x^{-p} dx \\
 &= \frac{1}{C_p} \left[\frac{1}{1-p} x^{1-p} \right]_1^{\infty} = \frac{1}{C_p} \cdot \frac{1}{1-p} \cdot \left(\underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\overset{<0}{1-p}}}_{=0} - \underbrace{1^{1-p}}_{-1} \right) \\
 &= \frac{1}{C_p} \frac{1}{p-1}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{für } C_p = \frac{1}{p-1} \text{ gilt } \int_{\mathbb{R}} g(x) dx = 1$$

$$\Rightarrow \text{für } C_p = \frac{1}{p-1} \text{ ist } g \text{ eine Dichtefunktion}$$

a) Beh: Jede Verteilungsfunktion hat höchstens abzählbar viele Unstetigkeitsstellen

Bew: i) Nach der Gm. Üb ist $x \in \mathbb{R}$ genau dann eine Unstetigkeitsstelle, wenn $F(x^-) < F(x)$ gilt.



ii) Für $x \neq y \in \mathbb{R}$ mit $F(x^-) < \overset{= \lim_{s \uparrow x} F(s)}{F(x)}$ und $F(y^-) < F(y)$ gilt $(F(x^-), F(x)) \cap (F(y^-), F(y)) = \emptyset$ da F monoton wachsend ist.

iii) Für jedes $x \in \mathbb{R}$ mit $F(x^-) < F(x) \exists q_x \in \mathbb{Q}$, sodass $F(x^-) < q_x < F(x)$
 $q_x \in (F(x^-), F(x))$, da \mathbb{Q} dicht in \mathbb{R} .

iv) Sei $U := \{x \in \mathbb{R} \mid F \text{ unstetig in } x\}$ und

$\psi: U \rightarrow \mathbb{Q}, u \mapsto \psi(u) := q_u$ (wie in iii)

mit $q_u \in (F(u^-), F(u))$

v) Wegen ii) ist ψ injektiv

(„jedes q hat nur max. ein Urbild“)
 sonst: $\exists u' \in U: q_u \in (F(u'^-), F(u'))$ ☹

Zusammen gilt

$$U = \psi^{-1}(\mathbb{Q}) = \overset{\mathbb{Q} \text{ abz.}}{\psi^{-1}} \left(\overset{\text{Ana 1}}{\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}} \right) = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \underbrace{\psi^{-1}(\{q\})}_{\text{abz.}}$$

Das Urbild $\psi^{-1}(\{q\})$ ist aufgrund der Injektivität höchstens ein Element, also insbesondere abzählbar.

$\Rightarrow U$ ist als abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen abzählbar.

b) Beh. $\{x \in \mathbb{R} \mid P(\{x\}) > 0\}$ ist höchstens abzählbar

Bew. Nach VL gilt

$$x \text{ ist Unstetigkeitsstelle} \iff P(\{x\}) > 0 \\ = F(x) - F(x-)$$

$$\Rightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid P(\{x\}) > 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid F \text{ unstetig in } x\} \stackrel{(a)}{=} U$$

\Rightarrow Nach a) ist U höchstens abzählbar

$\Rightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid P(\{x\}) > 0\}$ höchstens abzählbar

a) Beh: Falls f messbar ist gilt:

f integrierbar $\Leftrightarrow |f|$ integrierbar

Bew: Sei μ ein Maß auf \mathcal{A} bzgl. dem wir integrieren

„ \Leftarrow “ gilt offensichtlich, da

$$\int_{\Omega} f^+ d\mu \stackrel{\text{Mon}}{\leq} \int_{\Omega} |f| d\mu < \infty \text{ und } \int_{\Omega} f^- d\mu \stackrel{\text{Mon}}{\leq} \int_{\Omega} |f| d\mu < \infty$$

$|f|$ int. $|f|$ int.

„ \Rightarrow “: Es gilt $\int_{\Omega} f^+ + f^- d\mu < \infty$ und

$$|f|^+ = \max\{0, |f|\} = f^+ + f^-$$

$$|f|^- = -\min\{0, |f|\} \stackrel{|f| \geq 0}{=} 0. \text{ Damit folgt}$$

$$\int_{\Omega} |f|^+ d\mu = \int_{\Omega} f^+ + f^- d\mu < \infty \text{ und } \int_{\Omega} |f|^- d\mu \stackrel{|f|^- = 0}{=} 0$$

$\Rightarrow |f|$ ist integrierbar

b) Beh: f messbar $\Leftrightarrow |f|$ messbar

Bew: Sei A eine nicht-messbare Teilmenge von Ω , also $A \subseteq \Omega, A \notin \mathcal{A}$. Dann ist

$$f(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ -1, & \omega \notin A \end{cases}$$

$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \omega \mapsto \mathbb{1}_A(\omega) - \mathbb{1}_{A^c}(\omega)$ nicht messbar,

da z.B. $\exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ aber $f^{-1}(\{1\}) = A \notin \mathcal{A}$. $\exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}): f^{-1}(B) \notin \mathcal{A}$

$$f^{-1}(\{1\}) = \{\omega: f(\omega) = 1\} = \{\omega: \omega \in A\} = A$$

$|f|(\omega) = 1 \quad \forall \omega \in \Omega$, daher gilt für $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$|f|^{-1}(B) = \begin{cases} \Omega, & 1 \in B \\ \emptyset, & 1 \notin B \end{cases} \Rightarrow |f| \text{ messbar}$$

$$= \{\omega: |f|(\omega) \in B\}$$

$$= \{\omega: 1 \in B\}$$

$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}): |f|^{-1}(B) \in \mathcal{A}$

□

- Vor:
- $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folge von reellen Zahlen
 - $\mu: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty]$, $B \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} \delta_{x_n}(B)$ Map auf $\mathcal{B}(\mathbb{R})$
 - $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ messbare Funktionen $\leftarrow \delta_{x_n}(B) = \begin{cases} 1, & x_n \in B \\ 0, & x_n \notin B \end{cases}$

Beh: $f = g$ μ -fast überall $\Leftrightarrow f(x_n) = g(x_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Bew: Es gilt: $f = g$ μ -fast überall

$$\stackrel{\text{Def } \mu\text{-kü}}{\Leftrightarrow} \mu(\{f \neq g\}) = 0$$

$$\stackrel{\text{Def } \mu}{\Leftrightarrow} \sum_{n \in \mathbb{N}} \delta_{x_n}(\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq g(x)\}) = 0$$

$$\stackrel{\substack{\text{da Map} \\ \delta_{x_n} \geq 0}}{\Leftrightarrow} \delta_{x_n}(\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq g(x)\}) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\stackrel{\text{Def } \delta_{x_n}}{\Leftrightarrow} x_n \notin \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq g(x)\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Leftrightarrow x_n \in \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = g(x)\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Leftrightarrow f(x_n) = g(x_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \square$$