Aufgabe 1

- a) Skizziere die 4 Mengenoperationen für 2 Mengen.
- b) Sei $\Omega = \{a, b, 1\}$. Gebe $\mathcal{P}(\Omega)$ an.
- c) Beweise die De Morgan'schen Rechenregeln:

$$\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right)^C = \bigcap_{n \in I} A_n^C \quad \text{und} \quad \left(\bigcap_{n \in I} A_n\right)^C = \bigcup_{n \in I} A_n^C.$$

Versuche dabei, jeden Rechenschritt so genau wie möglich zu begründen.

b) $\Omega = \{a, b, \eta\}$. $\mathcal{D}(\Omega) = \{ \Omega, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, \eta\}, \{b, \eta\}, \{a, \eta, b\} \}$

c). Sei $x \in (\bigcup_{n \in I} A_n)^c$, d.h. $x \notin \bigcup_{n \in I} A_n$

Eig. $\bigcup_{n \in I} (\Rightarrow) x \notin A_n \quad \forall n \in I$

Def.

$(\Leftarrow) x \in A_n^c \quad \forall n \in I$

Eig. $(\Leftarrow) x \in \bigcap_{n \in I} A_n^c$

• Sei $x \in (\bigcap_{n \in I} A_n)^c$, d.h. $x \notin \bigcap_{n \in I} A_n$

Eig. $(\Leftarrow) \exists n \in I : x \notin A_n$

Def.

$(\Leftarrow) \exists n \in I : x \in A_n^c$

Eig. $\bigcup_{n \in I} (\Rightarrow) x \in \bigcup_{n \in I} A_n^c$

Definition

Seien X, Y zwei nichtleere Mengen. Eine **Abbildung** f von X nach Y ist eine Vorschrift, die jedem Element $x \in X$ ein eindeutiges Element $f(x) = y \in Y$ zuordnet. Man schreibt

$$f : X \rightarrow Y, \quad x \mapsto f(x)$$

und nennt X den **Definitionsbereich** von f und Y den **Wertebereich** von f .

Für $X' \subseteq X$ definiert $f(X') := \{f(x) \in Y : x \in X'\}$ das **Bild** von X' unter f und für $Y' \subset Y$ definiert $f^{-1}(Y') := \{x \in X : f(x) \in Y'\}$ das **Urbild** von Y' unter f .

Aufgabe 2

Zeige folgende Eigenschaften und Rechenregeln:

- $f^{-1}(Y) = X$ und $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.
- Sei $A \subseteq Y$, dann gilt $f^{-1}(A^C) = (f^{-1}(A))^C$.
- Sei $(A_n)_{n \in I}$ eine Familie von Teilmengen von Y mit nichtleerer Indexmenge I , dann gilt

$$f^{-1}\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \bigcup_{n \in I} f^{-1}(A_n).$$

$$a) f^{-1}(Y) \stackrel{\text{Def.}}{=} \{x \in X : f(x) \in Y\} \stackrel{\text{Def.}}{=} X$$

$$f^{-1}(\emptyset) \stackrel{\text{Def.}}{=} \{x \in X : f(x) \in \emptyset\} \stackrel{\text{Def.}}{=} \emptyset$$

$$b) \text{ Sei } x \in f^{-1}(A^c), \text{ d.h. } f(x) \in A^c \stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} f(x) \notin A \\ \stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} x \notin f^{-1}(A)$$

$$c) \text{ Sei } x \in f^{-1}\left(\bigcup_n A_n\right), \text{ d.h. } f(x) \in \bigcup_n A_n$$

$$\stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} \exists n \in \mathbb{N} \text{ mit } f(x) \in A_n$$

$$\stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} \exists n \in \mathbb{N} \text{ mit } x \in f^{-1}(A_n)$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup_n f^{-1}(A_n)$$

Sei $A \subseteq X$, dann nennen wir die Abbildung

$$\mathbf{1}_A : X \rightarrow \{0, 1\}, \quad x \mapsto \mathbf{1}_A(x) := \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

die **Indikatorfunktion** der Menge A . Für Indikatorfunktionen gelten folgende Rechenregeln:

- i) $\mathbf{1}_{A \cap B}(x) = \mathbf{1}_A(x) \cdot \mathbf{1}_B(x)$,
- ii) $\mathbf{1}_{A \cup B}(x) = \mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x) - \mathbf{1}_{A \cap B}(x)$,
- iii) $\mathbf{1}_{A \setminus B}(x) = \mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_{A \cap B}(x)$,
- iv) $\mathbf{1}_{A^c}(x) = \mathbf{1}_X(x) - \mathbf{1}_A(x) = 1 - \mathbf{1}_A(x)$,
- v) $\mathbf{1}_{A \Delta B}(x) = \mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x) - 2 \cdot \mathbf{1}_{A \cap B}(x)$.

Aufgabe 3

Zeige die ersten beiden Eigenschaften der vorherigen Folie.

Sei $x \in X$ bel.

i) Gelte $1_{A \cap B}(x) = 1 \stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} x \in A \cap B \stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge x \in B$

$$\Leftrightarrow 1_A(x) \cdot 1_B(x) = 1$$

ii) $1_A(x) + 1_B(x) - 1_{A \cap B}(x) \quad \parallel \quad 1_{A \cup B}(x)$

$$= \begin{cases} 1, & x \in A \wedge x \in B \\ 1, & x \notin A \wedge x \in B \\ 1, & x \in A \wedge x \notin B \\ 0, & x \notin A \wedge x \notin B \end{cases} \stackrel{\text{Vergleich}}{=} \begin{cases} 1, & x \in A \cup B \\ 0, & x \in A^c \cap B^c \\ & = (A \cup B)^c \end{cases}$$