

## 5. Übung

### 1. Dichten und Verteilungsfunktionen.

Seien der messbare Raum  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  und  $a, b, s, t, \lambda \in \mathbb{R}$  mit  $a < b$  und  $\lambda, s > 0$  gegeben. Das Wahrscheinlichkeitsmaß mit der Verteilungsfunktion

$$F_1: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto \frac{x-a}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) + \mathbb{1}_{(b,\infty)}(x),$$

heißt *Gleichverteilung auf  $[a, b]$*  und das Wahrscheinlichkeitsmaß mit der Verteilungsfunktion

$$F_2: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto (1 - e^{-\lambda x}) \mathbb{1}_{[0,\infty)}(x),$$

*Exponentialverteilung mit Parameter  $\lambda$* . Sei zudem die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + (x-t)^2},$$

gegeben, welche die Dichtefunktion der *Cauchyverteilung mit Parameter  $s$  und  $t$*  bezeichnet.

- a) Finde Dichtefunktionen für die Exponentialverteilung mit Parameter  $\lambda$  und die Gleichverteilung auf  $[a, b]$ .

(4 Punkte)

- b) Gebe eine Dichtefunktion und die zugehörige Verteilungsfunktion an, sodass für das korrespondierende Wahrscheinlichkeitsmaß  $\mathbb{P}$  auf  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

$$\mathbb{P}((-\infty, 1)) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}([1, \infty)) = \frac{2}{3}$$

gilt.

*Hinweis: Exponential- und Gleichverteilung sind hier nicht erlaubt.*

(4 Punkte)

- c) Zeige, dass  $f$  tatsächlich eine Dichtefunktion definiert und beschreibe den Effekt der Parameter  $s$  und  $t$  auf die Verteilung der Masse der Cauchyverteilung.

(3 Punkte)

- d) Nach Analysis I gilt für  $p > 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} < \infty \Leftrightarrow p > 1.$$

Zeige, dass für alle  $p > 1$  eine Konstante  $C_p \in \mathbb{R}$  existiert, sodass

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{C_p} x^{-p} \mathbb{1}_{[1,\infty)}(x),$$

eine Dichtefunktion definiert.

(3 Punkte)

## 2. Nochmal Unstetigkeitsstellen von Verteilungsfunktionen.

a) Zeige, dass jede Verteilungsfunktion höchstens abzählbar viele Unstetigkeitsstellen besitzt. (3 Punkte)

b) Folgere aus a), dass für ein Wahrscheinlichkeitsmaß  $\mathbb{P}$  auf  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  die Menge

$$\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(\{x\}) > 0\}$$

höchstens abzählbar ist.

(2 Punkte)

## 3. Integrierbarkeit messbarer Funktionen.

Sei der messbare Raum  $(\Omega, \mathcal{A})$  und die Funktion

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

gegeben.

a) Zeige, dass falls  $f$  messbar ist,  $f$  genau dann integrierbar ist, wenn  $|f|$  integrierbar ist. (4 Punkte)

b) Zeige, dass die Messbarkeit von  $f$  im Allgemeinen nicht äquivalent zur Messbarkeit von  $|f|$  ist.

(3 Punkte)

## 4. Noch mehr zu Dirac-Maßen.

Seien eine Folge von reellen Zahlen  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und das Maß

$$\mu: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty], \quad B \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} \delta_{x_n}(B),$$

auf  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  gegeben. Zeige, dass die messbaren Funktionen

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

genau dann  $\mu$ -fast überall übereinstimmen, wenn

$$f(x_n) = g(x_n)$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt.

(4 Punkte)

*Hinweis: Hierbei stimmen  $f$  und  $g$   $\mu$ -fast überall überein, falls*

$$\mu(\{f \neq g\}) = 0$$

*gilt.*

**Die Lösungen sind in Zweiergruppen bis Dienstag den 08. Oktober 2019, 18:00 Uhr, in den Briefkasten eures Tutors in A5 einzuwerfen.**